

Penggerek Daun/umbi

Written by ndik

Friday, 21 December 2012 01:31 - Last Updated Monday, 09 July 2018 00:54

Ulat Penggerek Daun/Umbi : *Phthorimaea operculella* Zell



Nama umum : *Phthorimaea operculella* (Zeller 1873) Klasifikasi : Kingdom : Animalia Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Lepidoptera

Famili : Gelechiidae

Sumber gambar : CABI



Morfologi/Bioekologi

- Di Jawa Barat OPT ini disebut 'ulat taromi' atau 'salisip'. Selain menggerek umbi kentang di gudang, OPT ini juga dapat merusak daun pada pertanaman kentang di lapangan.
- Ngengat berwarna coklat kelabu, kecil dan aktif pada malam hari. Pada siang hari ngengat bersembunyi di bawah helaian daun atau pada rak-rak penyimpanan umbi di gudang. Lama hidup ngengat betina berkisar antara 7 - 16 hari, sedangkan lama hidup ngengat jantan

Penggerek Daun/umbi

Written by ndik

Friday, 21 December 2012 01:31 - Last Updated Monday, 09 July 2018 00:54

berkisar antara 3 - 9 hari.

- Telur berukuran kecil, agak lonjong atau berbentuk bulat panjang, diletakkan pada permukaan bawah daun atau pada permukaan umbi yang tersembul di permukaan tanah. Di gudang, telur hampir selalu diletakkan pada permukaan atas umbi di sekitar mata tunas.

- Larva berwarna putih sampai kuning, tetapi dapat pula berwarna kehijau-hijauan. Larva memakan daun dengan cara membuat alur-alur pada daun atau membuat lubang dan lorong pada umbi. Panjang larva yang sudah berkembang sempurna sekitar 1 cm. Stadium larva berkisar antara 10 - 16 hari. Pupa terdapat dalam kokon yang tertutup oleh butiran -tanah. Di dalam gudang, pupa terdapat pada bagian luar umbi, biasanya pada mata tunas atau pada rak-rak gudang penyimpanan kentang. Lama stadium pupa adalah 6 - 9 hari.

- Hama penggerek daun/umbi tersebut menyebar di daerah sentra produksi kentang, antara lain di DI Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.

Gejala serangan

- Daun yang terserang terlihat berwarna merah tua dan nampak adanya jalinan seperti benang yang membungkus ulat kecil berwarna kelabu. Kadang-kadang daun kentang menggulung yang disebabkan oleh ulat yang merusak permukaan daun sebelah atas, bersembunyi dalam gulungan daun tersebut.

- Gejala serangan pada umbi dapat dilihat dengan adanya kotoran yang berwarna coklat tua pada kulit umbi. Apabila umbi tersebut dibelah akan kelihatan alur-alur yang dibuat oleh ulat sewaktu memakan umbi.

- Kerusakan berat pada pertanaman kentang sering terjadi pada musim kemarau. Di dalam gudang penyimpanan, hama tersebut merusak bibit kentang yang disimpan selama 3 – 5 bulan sebelum tanam.

Pengendalian

Penggunaan musuh alami. Pembubunan tanah dan penanaman umbi yang cukup dalam ± 20 cm. Pada waktu panen jangan meninggalkan umbi di lapangan. Membersihkan gudang-gudang penyimpanan dari sisa-sisa umbi yang ada. Penyemprotan insektisida seperti Dursban 20 EC, Bayrusil 25 EC dll.

Tanaman inang lain

- Tanaman inang OPT ini adalah tanaman kentang, tomat, kecubung, bit gula, terung dan tembakau.